

聖塔克萊拉縣精神健康

患者機密信息
參閱福利和機構法案 5328

患者姓名
(姓、名、中間名) _____
客戶 Unicare # _____
提供者 _____ 子碼 _____

門診病人藥物治療同意書

抗抑鬱藥物
(MAO 抑制劑)

非 FDA 指示的用途

我的醫生和我商討了以下問題：

本人精神或情緒疾病的性質及建議藥物治療的原因。
服用或不服用此類藥物的情況下本人病症好轉的可能性和可能的替代治療方案。
劑量範圍和服藥次數，服用方法和可能的服用時間。

我們討論了該藥物可能導致的副作用：

- | | | | |
|-------|-------------------------|----------------------------|-------------------|
| 較為常見： | 口乾
困倦 | 視力模糊
便秘 | 頭暈 |
| 較不常見： | 體重增加
過渡出汗
心跳加速 | 手足有麻痺或刺痛感
性功能障礙
小便困難 | |
| 罕見： | 心跳紊亂或異常
眼壓增加 (青光眼惡化) | 皮膚過敏
癲癇 | 不辨方向或思維混亂
肝臟問題 |

由於與某些食物和藥物共同服用時，此藥物可導致血壓急劇上升，因此服藥期間必須避免服食以下食物或藥物：
陳奶酪 扁(蠶豆)豆莢 度冷丁 動物肝臟、臘腸、意大利臘腸
腌製鯡魚/沙丁魚 酵母汁 緩解鼻部充血的藥劑 啤酒、葡萄酒、淡啤酒、酒精
意大利辣香腸 罐裝火腿 抑制食欲的藥物 泡菜

此種反應（血壓升高）的跡象包括：嚴重頭痛、潮紅、嘔吐、思維混亂和昏迷。
如果出現此類症狀，立即尋求緊急醫療協助。

我了解因為可能會產生困倦、喪失肌肉協調性等症狀，我在駕駛、操作機器或其它需要技巧的工作方面，能力可能受到影響。酒精則使這種影響更為嚴重。

如果我懷孕、計劃懷孕或處於哺乳期間，我將通知我的醫生。我了解在以上情況下服用這種藥物可能不安全。

我已閱讀本表格並了解其內容。

我知道我有權拒絕所建議的藥物治療，可隨時通知我的醫生。我同意按以下說明服用處方上的藥物。

- 不超過聖塔克萊拉縣精神健康服務機構藥物監控指南中認可的最大劑量；
- 不超過如下指示的日最大劑量：

藥物 (通用名)	指定的 每日最大劑量	患者簽名	醫生簽名	日期
_____	_____	_____	_____	_____